

KÜLSŐ CSOMAGOLÁS CÍMKÉJE, EGYBEN HASZNÁLATI UTASÍTÁS
DOXYPRIM 40% VÍZOLDHATÓ PULVIS A.U.V.
1kg, 5 kg műanyag tartály, 10 kg papírszak

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE
Doxypri 40% vízoldható pulvis A.U.V.

2. HATÓ- ÉS SEGÉDANYAGOK MEGNEVEZÉSE
Doxiciklin-hiklát 40 g/100g

3. KISZERELÉSI EGYSÉGEK
1 kg
5 kg
10 kg

4. CÉLÁLLAT FAJOK
Házityúk, pulyka, sertés.

5. JAVALLATOK
Doxiciklinre érzékeny kórokozók által előidézett alábbi kórképek gyógykezelésére:
Házityúk és pulyka: Idült légzőszervi betegség (CRD), pulyka meleagridis – mycoplasmosis, fertőző synovitis, baromfikolera, haemophilus-nátha, clostridiumok okozta fekélyes és elhalásos bélgyulladás, colibacillosis, chlamydiosis.
Sertés: *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* és *Bordetella bronchiseptica* okozta légzőszervi fertőzések.

6. ELLENJAVALLATOK
Nem ismertek.

7. MELLÉKHATÁSOK
A készítmény célállat-tolerancia vizsgálata során mellékhatásokat még háromszoros dózisban a javasolt kezelési időtartam kétszereséig történő alkalmazás során sem okozott.

8. ADAGOLÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS MÓDJA
A javasolt adagja házityúkoknak és pulykákknak 2,5-5,0 g/100 tkg (10-20 mg doxiciklin-hiklát/tkg):
A készítményt az ivóvízben oldva folyamatos itatás vagy lökésterápia formájában alkalmazhatjuk.
Folyamatos kezelés: a készítményt 1 g/3-6 liter dózisban (67-133 mg doxiciklin-hiklát/liter) adagoljuk az ivóvízben. A terápia során az állatok kizárólag a medikált ivóvizet fogyaszthatják.
Lökésterápia: a kezelendő állatcsoport testtömege alapján számított napi adagot a madarak által 4-8 óra alatt elfogyasztott ivóvízben oldjuk, és a nap hátralévő részében gyógyszermentes ivóvizet itatunk.
Sertés: 15 mg doxiciklin-hiklát/tkg/nap, amit az ivóvízben 100-150 mg doxiciklin-hiklát/liter (1 g Doxypri 40%/2-2,67 liter ivóvíz) koncentráció adagolásával, a takarmányban pedig 200-250 mg doxiciklin-hiklát/tak. kg (0,5-0,625 g Doxypri 40%/tak. kg) alkalmazásával biztosíthatunk.
A kezelés javasolt időtartama baromfifajokban 3-5 nap, sertésben 5-7 nap.


9. KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉSEK


9.1 Túladagolás (tünetek, sürgősségi intézkedések, antidotumok)
A készítmény terápiás sávja széles, valamennyi célállatfajban, túladagolására csak extrém nagy adagok alkalmazása esetén kerülhet sor. Amennyiben a kezelés során feltételezett toxikus vagy egyéb nemkívánatos hatás jelentkezik, a készítmény adagolását azonnal abba kell hagyni és szükség esetén megfelelő tüneti kezelést kell alkalmazni.

9.2 Gyógyszerkölsönhatások és egyéb interakciók
A doxiciklin és más hatóanyagok, illetve készítmények közötti terápiai, illetve toxikológiai szempontból jelentős kölcsönhatás nem ismert.
A korábbi tetraciklinekkel szemben a doxiciklin kevésbé lép kölcsönhatásba kétértékű ionokkal, így pl. kalciummal. Felszívódását a takarmány egyidejű jelenléte kisebb mértékben csökkenti, mint az oxitetraciklinét vagy a klórtetraciklinét. A doxiciklin biológiai hasznosulását éheztetett, illetve etetett brojlécsirkékben 73,4, illetve 61,1%-nak találtuk.

9.3 Fontosabb inkompatibilitások
Nem ismertek.

9.4 Alkalmazás vemhesség, laktáció, tojásrakás idején
Árutojást-termelő állatoknak nem adható!
Laboratóriumi állatokon végzett kísérletekben a doxiciklin nem bizonyult embriotoxikusnak, illetve teratogénnek. A készítmény ártalmatlanságát vemhes kocákban nem vizsgálták.





10. ÉLELMEZÉS EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Házityúk, pulyka ehető szövetek: 4 nap.

Sertés ehető szövetek: 3 nap.

Árutozás termelő állományok a készítménnyel nem kezelhetők.

11. AZ ÁLLATOK KEZELÉSÉT VÉGZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI ÓVÓRENDSZABÁLYOK

A tetraciklinekkel szembeni ismert túlérzékenység esetén kerülni kell a készítménnyel való érintkezést.

A készítmény ivóvízbe/takarmányba való bekeverésekor védőruházat, gumikesztyű, porálc és védőszemüveg viselése kötelező.

12. LEJÁRATI IDŐ

Felhasználható {hónap / év 00/0000} ig. A gyógyszeres ivóvíz 24 órán belül felhasználandó.

13. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ELŐÍRÁSOK

Legfeljebb 25°C-on, száraz, fénytől védett helyen tárolandó.

14. KÜLÖNLEGES ÓVINTÉZKEDÉSEK A FEL NEM HASZNÁLT GYÓGYSZER-KÉSZÍTMÉNYEK VAGY HULLADÉKAIK MEGSEMISÍTÉSÉRE, HA SZÜKSÉGES

A fel nem használt állatgyógyászati készítményt, valamint az állatgyógyászati készítményből származó hulladék anyagokat a helyi hatósági követelményeknek megfelelően kell megsemmisíteni.

15. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” megjelölés

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra

16. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” megjelölés

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

17. A FORGALOMBA-HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE ÉS CÍME, VMINT AZ EEA TERÜLETÉN A KÉSZTERMÉK FELSZABADÍTÁSÁÉRT FELELŐS GYÁRTÓ NEVE ÉS CÍME, HA NEM AZONOS AZ ELŐBBIVEL

Engedélyes: LAVET Kft. (1161 Budapest, Ottó u. 14.).

Gyártó: LAVET Kft. (2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4/b).

18. TÖRZSKÖNYVI SZÁM

1192/2000.

19. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Gy.sz.: {szám}

20. RENDELHETŐSÉG/KIADHATÓSÁG

Csak állatorvosi rendelvényre kiadható állatgyógyászati készítmény.

21. FORGALMAZHATÓSÁG

Állatgyógyászati készítmények forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.